

| Esiti considerati | Frequenza nei non trattati | RAR | NNT |
|--|-----------------------------------|------------|------------|
| Persistenza di otalgia a 24 ore (3 RCT) | 40 | -0,3 | 333 |
| Persistenza di otalgia a 2-7 gg (6 RCT) | 14 | -5,2* | 19 |
| Persistenza sintom. locale e sistemica a 7-14 gg (4 RCT) | 19 | -13,7* | 7 |
| OMA controlaterale (3 RCT) | 17 | -5,9* | 17 |
| Perforazione del timpano (2 RCT) | 7 | -3,4 | 29 |
| Sordità a 3 mesi (2 RCT) | 26 | -5,3 | 19 |
| OMA ricorrente (5 RCT) | 22 | -0,1 | 1000 |

**Statisticamente significativo*

RAR= Riduzione significativa del rischio. Si ricava dalla differenza tra la frequenza dell'evento tra i pazienti trattati con l'antibiotico e quelli non trattati. Il segno meno indica un beneficio.

NNT= Numero di pazienti da trattare con l'antibiotico per ottenere un successo in più.

N.B. Nel gruppo trattato con antibiotico il rischio di vomito-diarrea-rash è del 16% vs 11% dei non trattati (Incremento Assoluto del Rischio del 5%)