

Neonato con elementi dentari palpabili in sede incisiva mandibolare. Qual è la diagnosi?

Rubrica [A colpo d'occhio](#)



POSSIBILI DIAGNOSI

1. Perla di Epstein
2. Dente neonatale
3. Nodulo di Bohn
4. Cisti della lamina dentale
5. Epulide congenita

Neonato con elementi dentari palpabili in sede incisiva mandibolare. Qual è la diagnosi?

DIAGNOSI CORRETTA

Dente neonatale

I denti presenti alla nascita sono definiti natali, mentre quelli che compaiono entro i primi 30 giorni di vita sono detti neonatali. Si tratta di un reperto raro, più spesso localizzato nella regione degli incisivi mandibolari, e nella maggior parte dei casi corrisponde a denti decidui erotti precocemente; più raramente può trattarsi di elementi soprannumerari. La gestione va individualizzata: nei denti stabili, non traumatici e non interferenti con l'alimentazione è possibile un atteggiamento osservazionale con counselling ai genitori; in presenza di marcata mobilità, difficoltà di attacco/suzione, trauma linguale o rischio di aspirazione, è indicata la valutazione odontoiatrica pediatrica per eventuale estrazione.



Bibliografia essenziale

Anusha Durairaj B, Gajula Shivashankarappa P, Muthukrishnan K, Saraswat Y. Natal and neonatal teeth: early diagnosis and management. *BMJ Case Rep.* 2023;16(11):e256249. Published 2023 Nov 21. doi:10.1136/bcr-2023-256249.