

Rash cutaneo in bambino in terapia con amoxicillina. Di cosa si tratta?

Rubrica [A colpo d'occhio](#)



POSSIBILI DIAGNOSI

1. Sindrome DRESS
2. Infezione da EBV
3. Morbillo
4. S. di Stevens-Johnson
5. Scarlattina

Rash cutaneo in bambino in terapia con amoxicillina. Di cosa si tratta?

DIAGNOSI CORRETTA

Infezione da EBV Il rash cutaneo è presente nel 3-15% dei bambini con infezione da EBV. E' tipicamente morbilliforme, ma può assumere anche caratteristica scarlattiniforme, maculare, petecchiale o orticarioide. La comparsa del rash in concomitanza con la somministrazione di ampicillina/amoxicillina era ritenuta in passato un'evenienza molto frequente (80-100% dei casi trattati). Più recentemente l'associazione è stata ridimensionata e la frequenza (20-30%) del rash in bambini trattati con amoxicillina non appare molto maggiore di quella normalmente osservata in corso di infezione da EBV. **Bibliografia**

- Chovel-Sella A1, Ben Tov A, Lahav E, et al. Incidence of rash after amoxicillin treatment in children with infectious mononucleosis. *Pediatrics* 2013;131:e1424-7.
- Hocqueloux L, Guinard J, Buret J, et al. Do penicillins really increase the frequency of a rash when given during Epstein-Barr Virus primary infection? *Clin Infect Dis* 2013;57:1661-2.
- Chew C, Goenka A. QUESTION 2: Does amoxicillin exposure increase the risk of rash in children with acute Epstein-Barr virus infection? *Arch Dis Child* 2016;101:500-2.