

## Lesione a livello del cuoio capelluto. Qual è la diagnosi?

Rubrica [A colpo d'occhio](#)



### POSSIBILI DIAGNOSI

1. Impetigine crostosa
2. Dermatite seborroica infantile
3. Psoriasi del cuoio capelluto
4. Kerion Celsi
5. Istiocitosi a cellule di Langerhans

# Lesione a livello del cuoio capelluto. Qual è la diagnosi?

## DIAGNOSI CORRETTA

### **Kerion Celsi**

Il Kerion Celsi è la forma infiammatoria profonda della tinea capitis: si presenta come una placca del cuoio capelluto tumefatta, dolente, "molle" alla palpazione, con pustole, essudazione purulenta, croste e alopecia; possono associarsi linfadenopatia regionale e febbre. È una grande imitatrice delle infezioni batteriche dei tessuti molli. La diagnosi va sospettata clinicamente e confermata, quando possibile, con esame micologico diretto, coltura e/o metodiche molecolari. Il trattamento è medico, con antifungino sistemico associato a terapia topica adiuvante; gli antibiotici sono riservati ai casi con sospetta o documentata sovrainfezione batterica. Un trattamento precoce e adeguato riduce il rischio di alopecia cicatriziale permanente.

### **Bibliografia essenziale**

Chiriac A, Diaconeasa A, Voicu C, et al. Kerion Celsi in infants and children-A narrative review 2010-2023. *Mycoses*. 2024;67(1):e13675. doi:10.1111/myc.13675.