
Rx digerente in bambina con vomito incoercibile dopo intervento correttivo per grave scoliosi. Quale possibile diagnosi?

Rubrica *A colpo d'occhio*



POSSIBILI DIAGNOSI


1. Ernia jatale
2. Reflusso gastroesofageo
3. Duplicazione duodenale
4. Sindrome dell’arteria mesenterica superiore
5. Ulcera duodenale

© Le immagini dei quiz della rubrica "A colpo d'occhio" sono di proprietà dell'ACP e non possono essere estrapolate e/o riprodotte

Rx digerente in bambina con vomito incoercibile dopo intervento correttivo per grave scoliosi. Quale possibile diagnosi?

DIAGNOSI CORRETTA

Sindrome dell'arteria mesenterica superiore La radiografia del tubo digerente con contrasto evidenzia una compressione a asso" tra arteria mesenterica superiore e aorta **(Figura)**. L'intervento di ente alterato i rapporti anatomici, determinando la compressione osi duodeno-digiunale.



Figura

Bibliografia

1. Altiok H, Lubicky JP, DeWald CJ, Herman JE. The superior mesenteric artery syndrome in patients with spinal deformity.Spine. 2005;30:2164-70.
2. Braun SV, Hedden DM, Howard AW. Superior mesenteric artery syndrome following spinal deformity correction. J Bone Joint Surg Am. 2006;88:2252-7.
3. Zhu Z-Z, Qiu Y. Superior mesenteric artery syndrome following scoliosis surgery: Its risk indicators and treatment strategy. World J Gastroenterol 2005;11:3307-10.

© Le immagini dei quiz della rubrica "A colpo d'occhio" sono di proprietà dell'ACP e non possono essere estrapolate e/o riprodotte