
Risonanza magnetica dell’encefalo in bambino di 4 mesi con pregressa meningite da *Streptococcus pneumoniae*

Rubrica *A colpo d'occhio*



POSSIBILI DIAGNOSI


1. Dilatazione dei ventricoli laterali
2. Dilatazione del terzo ventricolo
3. Atrofia cerebrale
4. Microascessi cerebrali
5. Dilatazione del quarto ventricolo

© Le immagini dei quiz della rubrica "A colpo d'occhio" sono di proprietà dell'ACP e non possono essere estrapolate e/o riprodotte

Risonanza magnetica dell’encefalo in bambino di 4 mesi con pregressa meningite da *Streptococcus pneumoniae*

DIAGNOSI CORRETTA

Dilatazione dei ventricoli laterali Esiti di meningite contratta all’età di tre mesi in un Paese dell’Africa sub-Sahariana, complicata da microascessi cerebrali e tromboflebite del sinus laterale sinistro. Permane, a livello della porzione anteriore del seno sagittale superiore, immagine triangolare compatibile con trombosi del seno venoso (Figura). Verrà posizionata derivazione ventricolo-
i neurologici complessivamente in circa il 30% dei casi. Tra
comotorio, paralisi cerebrale o dei nervi cranici, disturbi visivi. Il
si africani o del Sud-est asiatico.



ura

Bibliografia

- Jit M. The risk of sequelae due to pneumococcal meningitis in high-income countries: a systematic review and meta-analysis. J Infect. 2010;61:114-24.
- Edmond K, Clark A, Korczak VS, et al. Global and regional risk of disabling sequelae from bacterial meningitis: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis 2010;10:317-28.

© Le immagini dei quiz della rubrica "A colpo d'occhio" sono di proprietà dell'ACP e non possono essere estrapolate e/o riprodotte