

## Tumefazione mediana anteriore del collo, iperemica e dolente. Qual è la diagnosi?

Rubrica [A colpo d'occhio](#)



### POSSIBILI DIAGNOSI

1. Linfadenite laterocervicale suppurativa
2. Cisti branchiale del secondo arco
3. Igroma cistico
4. Ranula plunging
5. Cisti del dotto tireoglosso sovrainfetta

# Tumefazione mediana anteriore del collo, iperemica e dolente. Qual è la diagnosi?

## DIAGNOSI CORRETTA

### **Cisti del dotto tireoglosso sovrainfetta\***

La cisti del dotto tireoglosso è una frequente anomalia congenita del collo dovuta alla persistenza di un residuo del dotto tireoglosso. Si manifesta come tumefazione mediana, spesso vicina all'osso ioide, mobile con la deglutizione e talora con la protrusione della lingua. Può sovrainfettarsi, diventando dolente e arrossata. L'ecografia è l'esame iniziale di scelta; nelle forme infette si tratta prima l'infezione con antibiotico e, a flogosi risolta, si programma l'asportazione chirurgica secondo Sistrunk, per ridurre il rischio di recidiva.

### **Bibliografia essenziale**

Amos J, Sutton AE, Shermetaro C. Thyroglossal Duct Cyst. In: *StatPearls*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; July 6, 2025.