Paralisi faciale periferica e lesioni vescicolari del padiglione. Qual è la diagnosi?

Rubrica *A colpo d'occhio*



POSSIBILI DIAGNOSI

1. Paralisi di Bell idiopatica
2. Otite esterna batterica
3. Sindrome di Ramsay Hunt
4. Mastoidite acuta complicata
5. Herpes simplex labiale

© Le immagini dei quiz della rubrica "A colpo d'occhio" sono di proprietà dell'ACP e non possono essere estrapolate e/o riprodotte

Paralisi faciale periferica e lesioni vescicolari del padiglione. Qual è la diagnosi?

DIAGNOSI CORRETTA

Sindrome di Ramsay Hunt

La sindrome di Ramsay Hunt, o herpes zoster oticus, è dovuta alla riattivazione del virus varicella-zoster a livello del ganglio genicolato. La triade classica è paralisi periferica del VII nervo cranico omolaterale, otalgia e vescicole auricolari o del condotto uditivo; le lesioni possono però comparire dopo la paralisi o essere assenti nello zoster sine herpete. Il trattamento va iniziato precocemente con antivirale e steroide sistemico. La prognosi è migliore se la terapia antivirale viene avviata entro 72 ore.

Bibliografia essenziale

Kansu L, Yilmaz I. Herpes zoster oticus (Ramsay Hunt syndrome) in children: case report and literature review. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2012;76(6):772-776. doi:10.1016/j.ijporl.2012.03.003.

© Le immagini dei quiz della rubrica "A colpo d'occhio" sono di proprietà dell'ACP e non possono essere estrapolate e/o riprodotte