Anomalia congenita del piede. Di quale forma si tratta?

Rubrica *A colpo d'occhio*



POSSIBILI DIAGNOSI

1. Convesso
2. Equino varo supinato
3. Talo valgo
4. Metatarso varo

© Le immagini dei quiz della rubrica "A colpo d'occhio" sono di proprietà dell'ACP e non possono essere estrapolate e/o riprodotte

Anomalia congenita del piede. Di quale forma si tratta?

DIAGNOSI CORRETTA

Equino varo supinato La forma posturale (o posizionale) è secondaria a malposizione in utero ed è facilmente riducibile manualmente già nel neonato. La forma malformativa congenita può essere idiopatica o sindromica (associata a mielodisplasia, artrogriposi, trisomia 18 o delezione 22q11), interessa 1:1.000 neonati, con una maggiore prevalenza (2:1) nei maschi ed è bilaterale nel 50% dei casi. In relazione alla gravità del quadro, richiede generalmente trattamento precoce e intensivo che include manipolazioni, bendaggio funzionale, gessetti correttivi progressivi e ortesi plantari fino all'eventuale necessità di correzione chirurgica. **Bibliografia**

- Bridgens J, Kiely N. Current management of clubfoot (congenital talipes equinovarus). BMJ 2010;340:c355.
- Gray K, Pacey V, Gibbons P, et al. Interventions for congenital talipes equinovarus (clubfoot). Cochrane Database Syst Rev 2014 Aug 12;(8).
- Radler C. The Ponseti method for the treatment of congenital club foot: review of the current literature and treatment recommendations. Int Orthop 2013;37:1747-53.

(Contributo di: Paola Maltoni, Fisiatria dell'età evolutiva, AUSL della Romagna, Forlì)

© Le immagini dei quiz della rubrica "A colpo d'occhio" sono di proprietà dell'ACP e non possono essere estrapolate e/o riprodotte