

Rx del bacino in bambino con paralisi cerebrale infantile. Di cosa si tratta?

Rubrica [A colpo d'occhio](#)



POSSIBILI DIAGNOSI

1. Osteoma osteoide del femore destro
2. Lussazione della testa del femore sinistro
3. Osteonecrosi della testa del femore destro
4. Frattura del bacino
5. Frattura del collo del femore sinistro

Rx del bacino in bambino con paralisi cerebrale infantile. Di cosa si tratta?

DIAGNOSI CORRETTA

Lussazione della testa del femore sinistro Si noti anche la sfuggenza del profilo acetabolare dell'anca destra che, a distanza di circa un anno, mostrerà anch'essa segni di dislocamento (Figura 1). La prevalenza di problemi alle articolazioni coxo-femorali nei bambini con paralisi cerebrale (PC) è molto elevata, fino al 75% nei casi di PC più compromessi dal punto di vista funzionale. Lo squilibrio muscolare attorno all'articolazione coxo-femorale, dovuto all'ipertonia dei muscoli di abductori ed estensori, causa la progressiva lussazione della testa del femore. La gestione di questi bambini. Va sorvegliata con attenzione (farmaci come la tossina botulinica, baclofene) o provve



Figura 1

Bibliografia - Robb JE, Häggglund G. Hip surveillance and management of the displaced hip in cerebral palsy. J Child Orthop 2013;7:407-13. - Yildiz C, Demirkale I. Hip problems in cerebral palsy: screening, diagnosis and treatment. Curr Opin Pediatr 2014;26:85-92