Anomalia congenita del piede. Di quale forma si tratta?

Rubrica *A colpo d'occhio*



POSSIBILI DIAGNOSI

1. Convesso
2. Varo equino
3. Talo valgo
4. Metatarso varo

© Le immagini dei quiz della rubrica "A colpo d'occhio" sono di proprietà dell'ACP e non possono essere estrapolate e/o riprodotte

Anomalia congenita del piede. Di quale forma si tratta?

DIAGNOSI CORRETTA

Talo valgo Deformità posturale congenita del piede che presenta un'eccessiva dorsiflessione eventualmente associata a una limitazione della flessione plantare. La deformità può essere il risultato di una scorretta posizione intrauterina con il piede del feto schiacciato contro la parete dell'utero ed è per lo più facilmente riducibile con esito favorevole. Più raramente ha caratteristiche malformative con astragalo verticale e talismo rigido e non riducibile. Può associarsi a una displasia evolutiva dell'anca o a mielodisplasia. Il trattamento con manipolazioni, bendaggi funzionali, gessetti progressivi e ortesi varia in relazione alla complessità del quadro. **Bibliografia**

- Widhe T, Aaro S, Elmstedt E. Foot deformities in the newborn, incidence and prognosis. Acta Orthop Scand 1988;59:176.
- Yu GV, Hladik J. Residual calcaneovalgus deformity: review of the literature and case study. J Foot Ankle Surg 1994;33:228.

(Contributo di: Paola Maltoni, Fisiatria dell'Età Evolutiva, AUSL della Romagna, Forlì)

© Le immagini dei quiz della rubrica "A colpo d'occhio" sono di proprietà dell'ACP e non possono essere estrapolate e/o riprodotte