

Anomalia congenita del piede. Di quale forma si tratta?

Rubrica [A colpo d'occhio](#)



POSSIBILI DIAGNOSI

1. Convesso
2. Varo equino
3. Talo valgo
4. Metatarso varo

Anomalia congenita del piede. Di quale forma si tratta?

DIAGNOSI CORRETTA

Talo valgo Deformità posturale congenita del piede che presenta un'eccessiva dorsiflessione eventualmente associata a una limitazione della flessione plantare. La deformità può essere il risultato di una scorretta posizione intrauterina con il piede del feto schiacciato contro la parete dell'utero ed è per lo più facilmente riducibile con esito favorevole. Più raramente ha caratteristiche malformative con astragalo verticale e talismo rigido e non riducibile. Può associarsi a una displasia evolutiva dell'anca o a mielodisplasia. Il trattamento con manipolazioni, bendaggi funzionali, gessetti progressivi e ortesi varia in relazione alla complessità del quadro. **Bibliografia**

- Widhe T, Aaro S, Elmstedt E. Foot deformities in the newborn, incidence and prognosis. Acta Orthop Scand 1988;59:176.
- Yu GV, Hladik J. Residual calcaneovalgus deformity: review of the literature and case study. J Foot Ankle Surg 1994;33:228.

(Contributo di: Paola Maltoni, Fisiatria dell'Età Evolutiva, AUSL della Romagna, Forlì)