


Esofagoscopia dopo rimozione di bolo alimentare in ragazzo di 14 anni con storia di disfagia e ripetuti impatti alimentari. Di cosa si tratta?

Rubrica [A colpo d'occhio](#)



POSSIBILI DIAGNOSI

1. Esofagite da reflusso
2. Eterotopia gastrica
3. Stenosi esofagea
4. Esofagite eosinofila

Esofagoscopia dopo rimozione di bolo alimentare in ragazzo di 14 anni con storia di disfagia e ripetuti impatti alimentari. Di cosa si tratta?

DIAGNOSI CORRETTA

Esofagite eosinofila Il quadro endoscopico è di grave esofagite con estese lesioni della mucosa che appare friabile e lacerata in alcuni tratti (Figura 1). L'istologia conferma l'esofagite cronica con un infiltrato di oltre 20 eosinofili intraepiteliali per campo ad alto ingrandimento. C'è positività delle IgE specifiche per latte e caseina (Bos d 8). E' stato impostato trattamento con fluticasone locale, lansoprazolo e dieta priva delle proteine del latte. L'esofagite eosinofila è una patologia esofagea cronica caratterizzata da un infiltrato eosinofilo (>15 eosinofili x campo ad alto ingrandimento) nell'epitelio esofageo. Predilige il sesso maschile e la disfagia per i solidi e i ripetuti episodi di impatto alimentare sono i sintomi tipici nel bambino più grande e nell'adolescente. Molti pazienti hanno storia personale di atopia.

Figura 1 (Cortesia del Dott. Enrico Ricci, Forlì)

