

Rx piede destro in bambino con piccola ferita in corrispondenza dell'alluce. Di cosa si tratta?

Rubrica [A colpo d'occhio](#)



POSSIBILI DIAGNOSI

1. Frattura del cuneiforme
2. Osteomielite del primo metatarso
3. Frattura del secondo metatarso
4. Osteomielite del cuboide
5. Artrosi del primo metatarso

Rx piede destro in bambino con piccola ferita in corrispondenza dell'alluce. Di cosa si tratta?

DIAGNOSI CORRETTA

Osteomielite del primo metatarso Il bambino si era ferito con una scheggia di legno penetrata attraverso la scarpa in corrispondenza dell'alluce. Dopo il trattamento con amoxicillina-clavulanato, a distanza di circa tre settimane compare un'ulcera piagosa. La radiografia mostra un'area di rarefazione ossea di circa 12 mm nella testa del primo metatarso con versamento piogeno articolare (**Figura 1**). Il bambino è stato trattato con amoxicillina + ceftazidime e successivamente per os (amoxicillina + clavulanato) si è risolto il quadro clinico e radiologico. **Figura 1**



Figura 2



Bibliografia

1. Funk SS, Copley LA. Acute hematogenous osteomyelitis in children: pathogenesis, diagnosis, and treatment. Orthop Clin North Am 2017;48:199-208.

2. Peltola H, Pääkkönen M. Acute osteomyelitis in children. N Engl J Med 2014;370:352-60.
3. Schmitt SK. Osteomyelitis. Infect Dis Clin North Am 2017;31:325-38.