

Tumefazione a carico della falange distale del primo dito. Qual è il sospetto?

Rubrica [A colpo d'occhio](#)



POSSIBILI DIAGNOSI

1. Osteocondroma
2. Lesione di Nora
3. Osteosarcoma
4. Lesione di Langherans
5. Condrosarcoma

Tumefazione a carico della falange distale del primo dito. Qual è il sospetto?

DIAGNOSI CORRETTA

Lesione di Nora

La lesione di Nora è una rara entità clinica che colpisce l'apparato scheletrico, rappresentando meno dell'1% di tutti i tumori ossei. I sintomi variano da una massa ferma e indolore a una crescita dolorosa e rapida, talvolta con eritema sovrastante.

Radiologicamente, si presenta come una massa calcifica ben circoscritta attaccata alla superficie corticale dell'osso, mentre istologicamente mostra una cartilagine ipercellulare con un aspetto caratteristico. Il trattamento consiste nella resezione chirurgica, con una percentuale di recidiva che può arrivare fino al 55%.

Bibliografia

Misky AT, Thomson D, Jain A. Bizarre parosteal osteochondromatous proliferation (Nora's lesion) of the hand: management of a rare clinical entity. *BMJ Case Rep.* 2023;16(5):e253361. Published 2023 May 29. doi:10.1136/bcr-2022-253361.