Lattante con iperpronazione dell’avambraccio sinistro dalla nascita. Quale potrebbe essere la diagnosi?

Rubrica *A colpo d'occhio*



POSSIBILI DIAGNOSI

1. Sinostosi radioulnare congenita
2. Artrogriposi
3. Paralisi del plesso brachiale
4. Iperostosi ulnare

© Le immagini dei quiz della rubrica "A colpo d'occhio" sono di proprietà dell'ACP e non possono essere estrapolate e/o riprodotte

Lattante con iperpronazione dell’avambraccio sinistro dalla nascita. Quale potrebbe essere la diagnosi?

DIAGNOSI CORRETTA

Sinostosi radioulnare congenita (SRC) E’ la più comune anomalia funzionale congenita dell’articolazione del gomito. Nella grande parte dei casi si tratta di una malformazione isolata. Può coinvolgere un solo arto ma, se bilaterale, è generalmente familiare e interessa più frequentemente il sesso maschile. Può essere associata ad anomalie dei cromosomi X o Y o essere parte di quadri sindromici (s. di Apert, s. di Carpenter, artrogriposi, s. di Berant) o di altre cromosomopatie (cromosomi 8, 11, 18, 22, 23, 24) . La SRC comporta un lora, ridotta estensione ale e all’evoluzione nel a limitazione dell’es



Figura

© Le immagini dei quiz della rubrica "A colpo d'occhio" sono di proprietà dell'ACP e non possono essere estrapolate e/o riprodotte