

## Rimozione di una zecca dietro l'orecchio due settimane prima. Di cosa si tratta?

Rubrica [A colpo d'occhio](#)



### POSSIBILI DIAGNOSI

1. Otomastoidite
2. Eritema migrante
3. Cellulite
4. Reazione locale al disinfettante utilizzato

## Rimozione di una zecca dietro l'orecchio due settimane prima. Di cosa si tratta?

### DIAGNOSI CORRETTA

**Eritema migrante** La rimozione della zecca è avvenuta circa 2-3 giorni dopo la puntura e l'eritema è comparso a distanza di due settimane, accompagnato da una modesta linfadenite satellite. Si è deciso per il trattamento con amoxicillina per tre settimane e successiva esecuzione della sierologia per *borrelia*. L'eritema migrante è la manifestazione precoce di una malattia di Lyme e si manifesta dopo pochi giorni e fino ad un mese dopo la puntura della zecca. Possono esserci febbre, malessere generale, linfadenopatia, artromialgie. La possibilità di trasmissione dell'infezione inizia ad essere consistente dopo almeno 72 ore dal morso della zecca. I farmaci raccomandati sono doxiciclina, amoxicillina e cefuroxime. (*Segnalazione di Costantino Panza, S. Ilario d'Enza (RE)*)

- Med Mal Infect. 2019 May 13. doi: 10.1016/j.medmal.2019.04.381.
- Med Mal Infect 2019 May 31. doi: 10.1016/j.medmal.2019.05.001