Bambino di due anni con dermatite atopica

Rubrica *A colpo d'occhio*



POSSIBILI DIAGNOSI

1. Infezione da coxsackievirus
2. Eczema erpetico
3. Varicella
4. Micosi
5. Sindrome di Stevens-Johnson

© Le immagini dei quiz della rubrica "A colpo d'occhio" sono di proprietà dell'ACP e non possono essere estrapolate e/o riprodotte

Bambino di due anni con dermatite atopica

DIAGNOSI CORRETTA

Eczema erpetico Detto anche eruzione varicelliforme di Kaposi, è tipica dei bambini con dermatite atopica che vengono a contatto con l'herpes simplex virus 1 o 2 sviluppando una forma disseminata anche grave, soprattutto se in età inferiore a 3 anni. Il padre aveva avuto una recidiva di herpes labiale alcuni giorni prima dello sviluppo delle lesioni nel bambino. E' frequente la sovrainfezione batterica con impetiginizzazione da stafilococco, streptococco o pseudomonas e va prestata particolare attenzione alla comparsa di lesioni perioculari (rischio di cheratocongiuntivite). La forma disseminata con coinvolgimento pluriorgano o meningite/encefalite ha una mortalità non trascurabile (1-9%). Il trattamento con acyclovir deve essere tempestivo, per via orale nei casi più lievi, endovenoso nelle situazioni più impegnative per almeno 10 giorni. **Bibliografia**

- Khan A, Shaw L, Bernatoniene J. Fifteen-minute consultation: eczema herpeticum in a child. Arch Dis Child Educ Pract Ed 2015;100:64-8.
- Liaw FY, Huang CF, Hsueh JT, Chiang CP. Eczema herpeticum: a medical emergency. Can Fam Physician 2012;58:1358-61
- El Hachem M. Marco ha prurito. Quaderni acp 2016;23:82-83.

© Le immagini dei quiz della rubrica "A colpo d'occhio" sono di proprietà dell'ACP e non possono essere estrapolate e/o riprodotte