Neonato con moncone ombelicale che delimita un’estroflessione mucosa con orifizio centrale. Di cosa si tratta?

Rubrica *A colpo d'occhio*



POSSIBILI DIAGNOSI

1. Gastroschisi
2. Fistola enterocutanea
3. Estrofia vescicale
4. Residuo dell’uraco


© Le immagini dei quiz della rubrica "A colpo d'occhio" sono di proprietà dell'ACP e non possono essere estrapolate e/o riprodotte

Neonato con moncone ombelicale che delimita un’estroflessione mucosa con orifizio centrale. Di cosa si tratta?

DIAGNOSI CORRETTA

Residuo dell’uraco Dall’orifizio fuoriesce piccola quantità di materiale corpuscolato e alla radiografia dell’addome è possibile seguire il decorso del catetere **(Figura)** che, inserito nel tramite, si porta medialmente in sede sovravescicale. Nell’embrione l’uraco, che mette in comunicazione la vescica con l’ombelico, si oblitera nel corso dello sviluppo fetale, dando origine al legamento ombelicale mediano. La mancata obliterazione parziale o totale dell’uraco dà luogo a diverse anomalie uracali (fistola ombelicale, cisti uracale, sinus uracale, diverticolo vescicale) e si manifesta con fuoriuscita di urina e/o pus dall’ombelico, onfalite o sintomatologia urinaria. Talora è un rilievo ecografico o cistografico occasionale. I residui uracali sono a rischio di infezioni addominali e/o urinarie o di degenerazione maligna e possono essere asportati chirurgicamente, soprattutto se sintomatici.

Figura



© Le immagini dei quiz della rubrica "A colpo d'occhio" sono di proprietà dell'ACP e non possono essere estrapolate e/o riprodotte